

≡ Quines són les teves preferències?

SELECCIONEM

Aquesta aplicació pot ajudar-te a col·laborar amb el teu metge per escollir el tractament farmacològic en el cas de l'esclerosi múltiple remitent-recurrent.

Per altres tipus d'esclerosi múltiple (com poden ser les formes progressives que no presenten brots) t'aconsellem que consultis amb l'equip de neurologia de la teva unitat.

Actualment existeixen diversos tractaments per l'esclerosi múltiple remitent-recurrent. Per ajudar-te a seleccionar quina és l'opció que millor s'adapta a tu et demanarem que triïs varíes opcions en aquesta aplicació.

Durant el procés anirem guiant-te i et mostrarem activades aquelles opcions disponibles segons el que vagis triant.

COMENÇAR

☰ Quines són les teves preferències?

Perfil

L'esclerosi múltiple remitent-recurrent es caracteritza pels brots i els períodes de recuperació. Si coneixes el perfil de la teva malaltia, si us plau, selecciona'l.

En cas contrari selecciona "No ho sé".

Escull una opció



Lleu

S'acostuma a parlar de malaltia lleu quan es pateixen pocs brots en molt temps i quan aquests deixen poques seqüèlies.



No ho sé



Greu

S'acostuma a parlar de malaltia greu quan el nombre de brots es major en menys temps i queden més seqüèlies al llarg del temps.

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

☰ Quines són les teves preferències?



Continuem?


Selecciona quina de les següents opcions és més important per a tu a l'hora d'escollir un tractament:

Escull una opció



Freqüència

Periodicitat amb la qual vols rebre el tractament.



Reducció de brots

Capacitat del tractament per reduir el nombre brots.



Via d'administració

Forma amb què vols rebre el tractament.

SELECCIONAR

SELECCIONAR

SELECCIONAR

☰ Quines són les teves preferències?



Freqüència

Periodicitat amb la qual vols rebre el tractament.

Escull una opció



2 cops al dia

Dues vegades al dia

SELECCIONAR



Diària

Una vegada al dia

SELECCIONAR



Cada 2 dies

Una vegada cada dos dies

SELECCIONAR



3 cops per setmana

Tres vegades per setmana

SELECCIONAR



Setmanal

Una vegada a la setmana

SELECCIONAR



Cada 2 setmanes

Una vegada cada dues setmanes

SELECCIONAR



Mensual

Una vegada al mes

SELECCIONAR



Anual

Una vegada a l'any

SELECCIONAR

☰ Quines són les teves preferències?



Has arribat al final de l'aplicatiu.

Interferon beta-1a

(Rebif®)

[DESCARREGAR RESULTAT](#)

Acetat de glatiràmer

(Copaxone®/Acetat de glatiràmer®)

[DESCARREGAR RESULTAT](#)

Freqüència

3 cops per setmana

Reducció de brots

Baixa

Via d'administració

Subcutània

Aquest és el resultat segons les teves preferències. Pots descarregar-te un document seleccionant "Descarregar resultat" que podràs imprimir on trobaràs els detalls del fàrmac que has triat i compartir-lo amb el teu equip professional.

Esperem que l'eina hagi estat d'utilitat.

Continua i respon a una enquesta per tal d'ajudar-nos a millorar!

SÍ

NO


[SELECCIONAR](#)

[SELECCIONAR](#)

[SELECCIONAR](#)

Interferó beta-1a

Rebif®



Interferó beta-1a

Rebif®

Principi actiu — Interferó beta-1a
Nom comercial — Rebif®

Freqüència	Reducció de brots	Via d'administració
3 cops per setmana	Balxa	Subcutània

- 1** Criteris per rebre el tractament
Esderosi múltiple activa
- 2** Criteris per retirar el tractament
Manca o pèrdua de resposta al tractament
Intolerància severa al fàrmac
Planificació o confirmació d'embaràs (segons criteri clínic)
- 3** Dosis
22 / 44 micrograms
- 4** Reducció de brots
Reducció aproximada del 33% del nombre de brots en un any (respecte a placebo)
- 5** Freqüència
3 vegades a la setmana
- 6** Via d'administració
Subcutània
- 7** Controls analítics i visites
Visita i analítica cada 3 mesos el primer any
Posteriorment cada 6-12 mesos
- 8** Emmagatzematge
Refrigerat a temperatures de 2 a 8°C, però es poden emmagatzemar fins a 30 dies a temperatura ambient
- 9** Efectes secundaris més freqüents
Síndrome pseudo-gripal
Reacció al lloc d'injecció
- 10** Efectes secundaris menys freqüents
Alteració de la funció renal
Elevació dels enzims hepàtics
Depresió
- 11** Embaràs i allàtament
L'embaràs no està recomanat durant el tractament
Compatible amb risc molt baix per a l'allàtament

Acetat de glatiràmer

Copaxone®-Acetat de glatiràmer Mylan®


Reducció de brots



Embaràs i lactància



Controls i visites



Efectes secundaris

Més freqüents



Menys freqüents



Príncipi actiu **Acetat de glatiràmer**

Copaxone®-Acetat de glatiràmer Mylan® Nom comercial

Freqüència
3 cops per setmana

Reducció de brots
Balxa

Via d'administració
Subcutània

1
Criteris per rebre el tractament
Esferosi múltiple activa

2
Criteris per retirar el tractament
Manca o pèrdua de resposta al tractament
Intolerància severa al fàrmac
Planificació o confirmació d'embaràs (segons criteri clínic)

3
Dosis
40 mil·lígrams

4
Reducció de brots
Reducció aproximada del 33% del nombre de brots en un any (respecte a placebo)

5
Freqüència
3 vegades a la setmana

6
Via d'administració
Subcutània

7
Controls analítics i visites
Visita i analítica cada 3 mesos el primer any
Posteriorment cada 6-12 mesos

8
Emmagatzematge
Refrigerat a temperatures de 2 a 8°C, però es poden emmagatzemar fins a 7 dies a temperatura ambient

9
Efectes secundaris més freqüents
Reacció al lloc d'injecció
Lipodistrofia (acumulació o pèrdua de greix en determinades parts del cos)
Mal de cap
Nàusees

10
Efectes secundaris menys freqüents
Reacció post-injeccional immediata

11
Embaràs i allactament
L'embaràs no està recomanat durant el tractament
Compatible amb risc molt baix per a l'allactament